
Ospolot[®] Sultiam

Anvendelsesområde

Ospolot[®] benyttes til behandling af:

- rolandisk epilepsi
- encefalopati med CSWS
- Landau-Kleffner syndrom
- partiel epilepsi, når behandling med andre anti-epileptika har været resultatløs.

Hvornår bør Ospolot[®] ikke indtages

Overfølsomhed for sultiam eller kemisk lignende lægemidler (sulfonamid) eller andre tilsætningsstoffer i lægemidlet.

Forhøjet funktion af skjoldbruskkirtlen.

Forhøjet blodtryk.

Hvornår må Ospolot[®] kun indtages efter særlige forholdsregler

Dårlig nyrefunktion.

Graviditet og amning

Manglende information.

Forsigtighed og advarsel

Ingen specielle anbefalinger.

Trafiksikkerhed og maskinbetjening

Du bør tale med din læge om dette.

Reaktionsevnen kan nedsættes, specielt i opstart af behandlingen ved samtidig anvendelse af andre lægemidler, der kan påvirke centralnervesystemet, og ved indtagelse af alkohol. Evnen til at færdes i trafikken samt maskinbetjening kan ligeledes indskrænkes. Dette bør undgås de første par dage.

Samtidig behandling med andre lægemidler

Behandling med carbamazepin og Ospolot[®] nedsætter koncentrationen af Ospolot[®].

Behandling med phenytoin og Ospolot[®] øger koncentrationen af phenytoin.

Doseringsvejledning

Dosering fastlægges og kontrolleres individuelt af behandlende læge (overhold doseringsangivelsen, da Ospolot[®] ellers ikke virker rigtigt).

Hvor ofte og hvor meget

Startdosis: 3-5 mg pr. kg legemsvægt pr. dag.

Optrappes i løbet af en uge.

Vedligeholdelsesdosis: 5-10 mg pr. kg legemsvægt pr. dag.

Indtagelse

Indtages 2 gange daglig med rigelig væske. Må ikke tygges.

Omstilling til Ospolot[®] fra andet lægemiddel eller anden kombinationsbehandling bør ske gradvist.

Varighed

Varigheden af behandlingen og dosis er individuel og fastlægges af behandlende læge. Behandlingen må under ingen omstændigheder afsluttes eller afbrydes uden lægekontakt.

Forkert indtagelse / fejlmedicinering

Søg altid læge/vagtlæge og medbring denne brugsvejledning.

Hvis behandling afbrydes eller afsluttes før tid

Afslut aldrig selv behandlingen, da dette kan medføre anfald. Skal altid nedtrappes gradvist efter lægens anvisning.

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er let øget vejrtrækning (hyperventilation), som i de fleste tilfælde forsvinder, når den daglige Ospolot[®] dosis nedsættes.

I sjældne tilfælde kan der forekomme snurren i arme, ben og ansigt, mavebesvær, væggtab eller appetitløshed.

Ingen kendte alvorlige bivirkninger med effekt på de indre organer som f.eks. knoglemarv, lever, nyrer eller bugspytkirtel.

Ved allergisk reaktion overfor Ospolot[®]


Ved sværere allergiske reaktioner skal Ospolot[®] behandlingen afbrydes.

Gode råd i forbindelse med brug af medicin



God idé med faste tidspunkter for indtagelse af medicin

For at sikre den bedste virkning af medicinen er det en fordel at tage den på nogenlunde samme tid hver dag.



Fordele ved at anvende en doseringsæske

Ospolot® kan med fordel opbevares i en doseringsæske. Der kan du holde styr på, om du har husket at tage din medicin.

Undlad at opbevare æsken på steder med høj luftfugtighed (badeværelse, køleskab m.m.).



Glemt medicin

Da der er mange forskellige slags medicin, skal du huske at aftale med din læge, hvad du skal gøre, hvis du glemmer at tage din medicin.

	JAN	FEB	MAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Brug af anfaldskalender

Virkningen af din behandling bliver bl.a. vurderet ud fra hyppigheden af dine anfald. Derfor kan du med fordel benytte en anfaldskalender til at registrere dine anfald. Husk den til hver kontrol.



Blodprøvetagning

Det er som regel ikke nødvendigt at måle indholdet af Ospolot® i blodet.

Hvis du får anden epilepsimedicin, kan det være nødvendigt at måle indholdet af denne i blodet. Det er vigtigt, at blodprøven tages medicinfastende. Det vil sige, at det skal være mindst 8 timer, siden du sidst tog medicin.

Selvom blodprøven først bliver taget op ad formiddagen, er der normalt ingen grund til at være bange for at få et anfald. Måltider og drikke må indtages uden forbehold.

06/2006

DESITIN PHARMA A/S

Havnegade 55, st. tv. • DK-1058 København K • Tlf. +45 33 73 00 73 • Fax +45 33 73 00 77 • www.desitin.dk